

Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D Bouché, Index Sem. (Berlin), App.: 14. 1851; *H. hondurensense* Gleason.

Perennes, sufruticosas, erectas hasta 2 m de alto. Hojas angostamente elípticas a ovadas, 26 (8) cm de largo y 0.82.3 (3) cm de ancho, ápice agudo, base aguda a atenuada, haz moderada a densamente cubierta de tricomas aplicados (0.5) 11.8 mm de largo, envés escasamente pubescente a glabro excepto en los nervios, con tricomas 0.51.2 (1.6) mm de largo, pinnatinervias. Diciasios terminales bracteados, 515 cm de largo, flores 4-meras; hipantos maduros campanulados a suburceolados, 45 mm de largo, glabros a escasamente pubescentes con tricomas basalmente ásperos aplicados o con tricomas glandulares patentes; lobos del cáliz angostamente triangulares, persistentes; pétalos obovados, 68 mm de largo, blancos; estambres 8, dimorfos, los más grandes geniculados, anteras linear-oblongas, 2.53 mm de largo, cada una con un poro ventralmente inclinado, conectivo prolongado 1.52 mm y ventralmente modificado en un apéndice bífido 1.62 mm de largo, los estambres más pequeños erectos, anteras 22.2 mm de largo, conectivo apenas prolongado en un diminuto apéndice bigiboso; ovario 4-locular, súpero, envuelto por el hipanto. Fruto una cápsula; semillas cocleadas y tuberculadas, 0.5 mm de largo.

Local, en nebliselvas, bosques de pinos, zona norcentral; 8001700 m; fl y fr agoene; *Croat 42967, Stevens 10241*; Veracruz a Nicaragua. Un género con ca 27 especies restringidas a México y Centroamérica.