1. Coffea arabica L., *Sp. Pl.* 172 (1753). Lectotipo (designado por Bridson, (1988): Arabia, Herb. Clifford59 ,*Coffea* 1 (BM). Ilustr.: Standley y Williams, *Fieldiana*, *Bot.* 24(11): 251, t. 45 (1975). N.v.: Café.
Por D.H. Lorence.
Arbustos oarbolitos hasta 8 m; ramitas glabras, frecuentemente horizontales a ligeramentepéndulas. Hojas 8-15(-19.5) × 2.5-6(-9) cm, elípticas, oblongo-elípticas uobovado-elípticas, cartáceas al secarse, glabras en ambas superficies, nítidasen el haz, la base aguda a obtusa, el ápice acuminado a caudado-acuminado conel acumen 1-2 cm y frecuentemente falcado; nervaduras secundarias 7-10(-12)pares, broquidódromas, éstas y la vena media generalmente amarillento-pardo pálido al secarse, frecuentemente en las axilascon domacios 0.10.4 mm, del tipo encripta, glabros; pecíolos 6-15 cm, glabros; estípulas 3-7(-12) mm,triangulares, agudas a acuminadas, aristadas, glabras. Inflorescencias 2.5-5 cm (incluyendo las corolas), con 1-9 flores,subcapitadas frecuentemente con apariencia de disposición verticilada, sésiles ocon pedúnculos hasta 2 mm; calículos 1-2 mm. Flores subsésiles, fragantes;hipanto c. 1.5 mm, cilíndrico-obcónico, glabro; limbo calicino 0.1-0.2 mm, glabro, 5-denticulado; corolainfundibuliforme, blanca, en el exterior glabra, en el interior vellosa,el tubo 9-14 mm, los lobos 5, 9-20 mm, linear-elípticos a oblongos, obtusos;anteras 5, 8-12 mm, exertas; estigmas 4-5 mm. Drupas 10-16 × 9-14 mm,anchamente elipsoidales a oblongas, abruptamente redondeadas en ambos extremos,glabras, rojas o anaranjadas. *Cultivada a gran escala en zonas húmedas y montanas, tambiénescapada y naturalizada.* T (*Conrad etal. 2844*, MO); Ch (*Breedlove yThorne 21024*, MO); Y (*Schott 73*, MO); B (*Balick et al. 2405*, MO); G (*Williams et al.41414*, F); H (*Molina R.33979*, MO); ES (*Carlson 257*, F); N (*Sandino 3611*, MO); CR (*Grayum y Sleeper6108*, MO); P (*Caballero 15*, MO). 0-3000 m. (Nativa del E. de África;ampliamente cultivada por toda la zona tropical húmeda.)