

DUSSIA Krug & Urb. ex Taub.; *Vexillifera* Ducke; *Cashalia* Standl.

Por Cheryl Crowder; modified by A. Pool, April 2010

Arboles, hasta 50 m de alto, base hasta 1 m de diámetro, fúlcrea, corteza lisa y gris, savia roja. Hojas imparipinnadas; folíolos 5–25, alternos a subopuestos, estipelas ausentes; estípulas diminutas, caducas. Inflorescencias racemosas o racemoso-paniculadas, bracteadas y bracteoladas, flores 15–25 mm de largo, rosadas a moradas o blancas; cáliz campanulado, algo oblicuo, con 5 lobos subiguales; pétalos libres, subiguales, estandarte pubescente por fuera, alas y quilla rectas; estambres 10, subiguales, filamentos esencialmente libres o subconnados en la base, pero uno de ellos semilibre, anteras ovadas, uniformes, dorsifijas; ovario 1–5-ovulado, pubescente, estilo incurvado, pubescente, estigma diminuto. Legumbres ovoide-elipsoides a obovoides, comprimidas lateralmente, leñosas, bivalvares, velutinas, dehiscentes; semillas 1 ó 2, elipsoides o cilíndricas, rojas, hilo pequeño, linear y lateral.

Género con ca 10 especies distribuidas desde el sur de México al centro de Perú, en la cuenca amazónica de Brasil y en las Antillas; 2 especies se conoce en Nicaragua.

V.E. Rudd. The genus *Dussia* (Leguminosae). Contr. U.S. Natl. Herb. 32: 247–277. 1963.