18. Siphoneugena O. Berg
Por F.R. Barrie.

Arbustos o árboles; variadamente pelosos, los pelos simples, rectos, recurvados o contortos. Ramitas comprimidas, pelosas o glabras. Hojas opuestas, pecioladas; glabras o delgadamente pelosas cuando jóvenes, finalmente glabrescentes o con algunos pelos persistentes; vena media convexa en ambas superficies o aplanada en el haz; nervaduras laterales ascendentes, delgadas, frecuentemente inconspicuas en una o en ambas superficies de las hojas maduras; nervaduras marginales similares a las nervaduras laterales, rectas, a 1-2 mm de los márgenes; pecíolos acanalados o sulcados. Inflorescencias axilares, racemosas o fasciculadas; botones frecuentemente contraídos por encima del ovario. Flores sésiles o pediceladas; bractéolas persistentes o deciduas después de la antesis. Flores con el hipanto prolongado formando una estructura en forma de copa por encima del ovario, cerrada en el botón o abierta en el ápice, partiéndose entre los lobos del cáliz y volviéndose refleja en la antesis, circuncísil en el ovario y limpiamente dehiscente después de la antesis, el hipanto y los estambres desprendiéndose como una unidad; lobos del cáliz 4, valvados, subiguales o en pares marcadamente desiguales; pétalos 4, blancos, pelosos en ambas superficies; estambres 50-200, las anteras 0.3-0.5 mm; ovario 2-locular; óvulos (2-)3-5(-7) por lóculo. Frutos en bayas, globosos, el pericarpo de paredes delgadas, la cicatriz circular del hipanto persistente; color negro-purpúrea en la madurez; embrión eugenoide, los cotiledones 2, plano-convexos, el hipocótilo c. 1 mm. 8 spp. (Mesoamérica, Venezuela, Guayanas, Perú, Brasil, Antillas.)
Bibliografía: Proença, C. *Edinburgh J. Bot.* 47: 239-271 (1990).
La única especie en Mesoamérica es *Siphoneugena dussii* .