ELYTRARIA Michx.

Elytraria imbricata (Vahl) Pers., Syn. Pl. 1: 23. 1805; *Justicia imbricata* Vahl.

Hierbas caulescentes, ocasionalmente acaulescentes, hasta 0.5 m de alto; tallos teretes a subcuadrangulares, glabros a pubérulos generalmente en 2 líneas. Hojas ovado-lanceoladas, 3.513 cm de largo y 24.5 cm de ancho, ápice agudo, base atenuada y ahusada sobre un pecíolo alado, márgenes undulados, escasamente pilosas pero los tricomas más densos en los nervios principales, cistolitos ausentes; pecíolos hasta 2 cm de largo o ausentes, pilosos. Inflorescencias 1numerosas espigas axilares y terminales, 528 cm de largo, ramificadas o simples, pedúnculos cubiertos de brácteas ovadas o subuladas, envainadoras, ligeramente aplicadas, brácteas florales oblongas a elípticas, 46 mm de largo y 1.52 mm de ancho, aristadas en el ápice y rígidas, brácteas superiores con 4 alas hialinas, flores sésiles, 58.5 mm de largo; sépalos 5, hasta 4.5 mm de largo, el posterior elíptico, 1.2 mm de ancho, bidentado, los laterales subulados, 0.7 mm de ancho, el anterior elíptico, 0.7 mm de ancho, bidentado, todos transparentes, pubérulos; corola bilabiada, glabra, lila pálida o azul, tubo cilíndrico, 47 mm de largo, labio superior 2-lobado, el inferior 3-lobado; estambres 2, apenas exertos, anteras ditecas. Frutos elípticos, ca 3 mm de largo y 1 mm de ancho, glabros; semillas sobre funículos papiliformes.

Común en áreas alteradas, zona pacífica; 10900 m; fl dicfeb, may, agonov, fr agomar, mayjun; *Sandino 274*, *2125*; suroeste de los Estados Unidos al oeste de Sudamérica. Género con ca 17 especies desde el sur de Norteamérica hasta los trópicos del Viejo y Nuevo Mundo. "Talcacao".