1. Frutos 812 mm de ancho; dientes superior y laterales del cáliz inconspicuos con diente ventral hasta 2 mm de largo; bractéolas 1419 mm de largo; flores 3.55 cm de largo; folíolos maduros 6.512.5 cm de ancho ... **C. plumieri**

1. Frutos 38 mm de ancho; dientes superior y laterales del cáliz prominentes con diente ventral 415 mm de largo; bractéolas 414 (16) mm de largo; flores 14.5 cm de largo; folíolos maduros 0.56 (9) cm de ancho

2. Folíolos 1; pecíolos alados ... **C. sagittatum**

2. Folíolos 3; pecíolos sin alas

3. Folíolos lineares a oblongo-lineares, menos de 1 cm de ancho

4. Flores 2.53 cm de largo; bractéolas 1113 mm de largo; dientes del cáliz desiguales, el ventral 68 mm de largo, los superiores y laterales hasta 1 mm de largo; pedúnculos 25 mm de largo; pedicelos 46 mm de largo; frutos 710 cm de largo; folíolos con 2040 pares de nervios primarios; raquis casi ausente, 0.10.2 cm de largo; estípulas 34 mm de largo ... **C. angustifolium**

4. Flores 11.5 cm de largo; bractéolas 48 mm de largo; dientes del cáliz subiguales, 45 mm de largo; pedúnculos 47 mm de largo; pedicelos 24 mm de largo; frutos 5.57 cm de largo; folíolos con 1519 pares de nervios primarios; raquis 0.71.2 cm de largo; estípulas 56 mm de largo ... **C. pascuorum**

3. Folíolos ovados a elípticos u oblongo-lanceolados, generalmente más de 2 cm de ancho

5. Bractéolas 69 mm de ancho, 35 veces la longitud del tubo del cáliz; legumbres 34 mm de ancho; inflorescencias 14.5 cm de largo

6. Dientes superiores y laterales del cáliz 34 mm de largo, diente ventral 79 mm de largo; hojas tomentoso-pilosas en el envés; inflorescencias 24.5 cm de largo, con pocas flores; hierba, tallos erectos o postrados, ápices subvolubles ... **C. arenarium**

6. Dientes superiores y laterales del cáliz 1.52 mm de largo, diente ventral 46 mm de largo; hojas glabras en el envés; inflorescencias 12.5 cm de largo, comúnmente con 1 sola flor; trepadoras, tallos volubles ... **C. brasilianum**

5. Bractéolas 46 mm de ancho, 23 veces la longitud del tubo del cáliz; legumbres 48 mm de ancho; inflorescencias (2) 411 cm de largo

7. Legumbres 45 mm de ancho; dientes superiores y laterales del cáliz subiguales hasta 2 veces la longitud del tubo del cáliz, 610 mm de largo, diente ventral 810 mm de largo; flores lilas a purpúreas ... **C. virginianum**

7. Legumbres 68 mm de ancho; dientes superiores y laterales del cáliz subiguales a ligeramente más cortos que el tubo del cáliz, 26 mm de largo; flores blancas con café a purpúreas en el centro del estandarte y los nervios

8. Tubo del cáliz 810 mm de ancho; el diente ventral del cáliz 912 (15) mm de largo, los dientes superiores y laterales 46 mm de largo; folíolos maduros 1015 cm de largo con raquis 1.53.5 cm de largo ... **C. macrocarpum**

8. Tubo del cáliz 57 mm de ancho; el diente ventral del cáliz 59 mm de largo, los dientes superiores y laterales 25 mm de largo; folíolos maduros 38 (11) cm de largo con raquis 0.41.5 (2) cm de largo

9. Bractéolas 611 mm de largo, pubérulas volviéndose micro-uncinadas con la edad; pedicelos floríferos 69 mm de largo, ascendente-pilosos, glabrescentes en fruto; dientes dorsales del cáliz libres 1/41/3 de su longitud; peciólulos 23 mm de largo; estípulas 23 mm de largo ... **C. molle**

9. Bractéolas 1016 mm de largo, densamente seríceas, menos así con la edad; pedicelos floríferos 36 mm de largo, densamente pubescentes, menos así cuando en fruto; dientes dorsales del cáliz libres casi 2/3 de su longitud; peciólulos 35 mm de largo; estípulas 35 mm de largo ... **C. pubescens**