CHELONANTHUS (Griseb.) Gilg

Chelonanthus acutangulus (Ruiz & Pav.) Gilg; *Lisianthius acutangulus* Ruiz & Pav.

Hierbas anuales, erectas, 0.5–1.5 (–3) m de alto, simples o con pocas ramas, glabras; tallos generalmente tetragonales y ligeramente alados en la base. Hojas opuestas, ampliamente ovadas a ovado-elípticas, 4–18 cm de largo y 2.7–10 cm de ancho, los 2 pares de nervios laterales marcadamente arqueados; sésiles a cortamente pecioladas. Inflorescencias axilares o terminales, dispuestas en dicasios laxos, simples o compuestos pero con apariencia racemosa y secundiflora, pedúnculos 3.5–14 cm de largo, pedicelos 4–11 mm de largo, brácteas subyacentes angostamente ovadas, 2–3 mm de largo, flores 2.2–3.2 cm de largo; cáliz 4–6 mm de largo, urceolado, lobos 5, ovados a subrotundos, 2–3 mm de largo; corola 22–32 mm de largo, amarillo-verdosa, lobos 5, ovados, 5–7 mm de largo y 6–8 mm de ancho basalmente, agudos; estambres incluidos o cortamente exertos, filamentos adheridos a ca 1/4 de la base, filiformes, 1.4–2 cm de largo, anteras reflexas, inconspicuamente mucronadas en el ápice; ovario 1-locular, oblongo, 4–6 mm de largo y 3–4 mm de diámetro, estilo ca 10 mm de largo, estigma con 2 lobos oblongos, aplanados, 3–4 mm de largo. Cápsula ca 1.5 cm de largo; semillas 0.2–0.3 mm de largo, anguladas, superficie reticulada.

Común, en áreas perturbadas, ruderal, zonas atlántica y norcentral; 10–1000 m; fl y fr durante todo el año; *Ortiz 1905*, *Sandino 5106*; sur de México al norte de Sudamérica. Un género con ca 12 especies sudamericanas, sólo esta especie se extiende a Mesoamérica. Treated in the published *Flora de Nicaragua* as *Chelonanthus alatus* (Aubl.) Pulle and also frequently treated as *Irlbachia alatus* (Aubl.) Maas.