1. Hojas en espiral, nervios terciarios oblicuos a horizontales; al menos los sépalos internos y/o los lobos de la corola ciliados

2. Hojas opacas, 1121 pares de nervios secundarios; tubo de la corola menos 1/2 de la longitud de los lobos, lobos internamente pilosos en la base, no ciliados, estambres adnados al ápice del tubo; fruto no lenticelado, testa de la semilla áspera y opaca, adherida al pericarpo, cicatriz 79 mm de ancho ... **C. colombianum**

2. Hojas lustrosas, 714 pares de nervios secundarios; tubo de la corola de 23 veces la longitud de los lobos en las flores estaminadas y casi de la misma longitud de los lobos en las flores pistiladas, lobos glabros y comúnmente ciliados, estambres adnados en la 1/2 basal del tubo; fruto densamente lenticelado, testa de la semilla lisa y brillante, no adherida al pericarpo, cicatriz 24 mm de ancho ... **C. venezuelanense**

1. Hojas dísticas, nervios terciarios paralelos a los secundarios y descendiendo desde el cordón marginal; sépalos y lobos de la corola no ciliados

3. Tubo de la corola de casi 3 veces la longitud de los lobos, filamentos más largos que las anteras; hojas abaxialmente con pocos tricomas aplicados; frutos subglobosos y con varias semillas ... **C. argenteum** ssp. **panamense**

3. Tubo de la corola más corto, igual o ligeramente más largo que los lobos, filamentos más cortos o iguales a las anteras; hojas esparcida a densamente seríceas; frutos variados, si subglobosos o con varias semillas entonces las hojas abaxialmente densa y persistentemente dorado a ferrugíneo seríceas

4. Hojas con el envés esparcida a densamente seríceo, los tricomas cremosos o blanco-iridiscentes, (7) 913 pares de nervios secundarios, muy fácilmente distinguibles de los intersecundarios y terciarios; tubo de la corola ligeramente más largo que los lobos, filamentos de la misma longitud que las anteras ... **C. brenesii**

4. Hojas con el envés densamente dorado o ferrugíneo seríceo (a veces se vuelve blanquecino o argénteo con la edad), 1324 pares de nervios secundarios, difíciles de distinguir de los intersecundarios y terciarios; tubo de la corola desde más corto hasta de la misma longitud que los lobos, filamentos más cortos que las anteras

5. Lobos de la corola medialmente seríceos externamente; frutos ovoides o subglobosos, 47 cm de largo con 2varias semillas, cicatriz adaxial en más de 1/2 a casi toda la longitud de la semilla; estigma 812-lobado; pecíolo 922 mm de largo ... **C. cainito**

5. Lobos de la corola glabros; frutos angostamente oblongos, 0.81.5 cm de largo con 1 semilla, cicatriz basiventral en 1/31/2 de la longitud de la semilla; estigma 4 ó 5 (6)-lobado; pecíolo 412 mm de largo ... **C. mexicanum**