14. Tachia Aubl .

Por G. Davidse.

Arbustos o árboles pequeños, algunas veces de un solo tallo; ramas teretes o cuadrangulares y aladas, frecuentemente huecas, verdes o conspicuamente amarillas. Hojas pecioladas, elípticas a obovadas, coriáceas o cartáceas, las nervaduras pinnadas con muchas nervaduras secundarias rectas o con 1-3 pares de nervaduras secundarias arqueadas basalmente divergentes, la base aguda a atenuada, los márgenes aplanados o recurvados, el ápice frecuentemente acuminado; ócreas (estípulas) interpeciolares presentes. Flores axilares, solitarias o rara vez en pares, (sub)sésiles en un cojinete muy corta en las axilas distales, 5-meras, ligeramente zigomórfas (tubo de la corola, estambres y estilo doblados), erectos a horizontales; brácteas ausentes. Cáliz tubular, amarillo, dividido 1/3-4/5 de su longitud, grueso y coriáceo, persistente o caduco en el fruto, los lobos elípticos a ovados, con un área dorsal glandular, a veces aquillados o alados, generalmente hialina-marginal, el ápice obtuso a agudo; corola tubular a hipocraterimorfa, ligeramente inflada por debajo del ápice, amarilla, color crema, anaranjada, blanca o verdosa, delgada a ligeramente carnosa, caduca o parcialmente persistente, los lobos erectos, patentes, o reflexos, el ápice agudo a apiculado, el botón del ápice de la corola atenuándose; estambres insertados cerca de la base en el tubo de la corola, los filamentos de longitud desigual, algunas veces agudamente doblados en el ápice, las anteras linear-oblongas, recurvas después de la antesis, con apéndices apicales estériles, el polen en mónadas, la exina reticulada o lisa, algunas veces con glóbulos; ovario con un disco glandular en la base, el estilo largo, delgado, caduco, el estigma 2-lamelado, los lobos anchos. Cápsulas elípticas, leñosas, horizontales a erectas, dehiscentes apicalmente, las valvas caducas; semillas globosas, no aladas, las células de la testa papiliformes. 10 spp. Mesoamérica, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.

Bibliografía: Maguire, B. y Weaver, R.E. *J. Arnold Arbor*. 56: 103-125 (1975).

La única especie en Mesoamérica es *Tachia parviflora* .