

20. *Fimbristylis* Vahl

Por C.D. Adams.

Anuales o perennes de talla corta a mediana. Tallos cespitosos o próximos entre sí, brotando de un rizoma rastrero, erectos, generalmente teretes y acostillados, a veces aplanados apicalmente, foliosos en la base. Hojas espiraladas, raramente (*F. littoralis*) dísticas, filiformes, aplanadas o involutas, a menudo uniformemente acostilladas en el envés y obtusas en la punta, generalmente más cortas que el escapo florífero, unión de la vaina y la lámina con o sin una lígula. Inflorescencia un corimbo umbeliforme, simple o compuesto; brácteas foliiformes. Espiguillas bisexuales, sésiles y pediceladas, en cimas pequeñas corta o largamente pedunculadas, a menudo con desarrollo prolongado. Glumas espiraladas, deciduas, las más bajas generalmente estériles, redondeadas en el envés o carinadas, la costilla media a menudo verde, la punta excurrente en un mucrón o cúspide corto u obtusa a emarginada; raquilla persistente. Flores bisexuales; perianto ausente; estambres 1-3; estigmas 2-3; estilo cuando 2-fido generalmente alargado, aplanado y fimbriado ciliado, cuando 3-fido subterete, agrandado en la base. Aquenios lenticular-obovoides a subtrígonos, redondeados u obtusos en la punta, sin la base del estilo persistente pero generalmente apiculados, los bordes generalmente con puntos diminutos horizontal-rectangulares en hileras verticales, a menudo claros y lustrosos. Aprox. 200 spp. Trópicos.

Bibliografía: Kral, R. *Sida* 4: 100-138, 166-197, 216-226 (1971).