

CODONANTHE (Mart.) Hanst.; *Hypocyrtia* sect. *Codonanthe* Mart.

Hierbas, subarbustos o lianas, epífitos, péndulos, rastreros o erectos, a veces creciendo dentro o sobre nidos de hormigas, nectarios extraflorales presentes en los nudos. Hojas opuestas, iguales a algo desiguales, gruesas y carnosas, glabras, frecuentemente con nectarios extraflorales rojizos en la lámina, cortamente pecioladas. Flores pocas, dispuestas en las axilas superiores, ebracteadas; cáliz 5-lobado, los lobos lanceolados, iguales a desiguales, 1 de ellos doblado hacia atrás por el espolón de la corola, enteros, con nectarios frecuentemente presentes en los senos; corola horizontal con respecto al cáliz, infundibuliforme, espolonada en la base; estambres 4, incluidos, didínamos, anteras con dehiscencia poricida; disco formado por un nectario dorsal, sencillo y grande; ovario súpero, estilo incluido, estigma estomatomorfo. Fruto una cápsula globosa, ovoide o deprimida, carnosa, bivalvada o tardíamente dehiscente y asemejándose a una baya.

Género con 20 especies distribuidas desde México hasta Brasil y Bolivia, también en las Antillas Menores; 2 especies en Nicaragua. Las especies sin flores son difíciles de determinar.

H.E. Moore. A synopsis of the genus *Codonanthe* [Gesneriaceae]. *Baileya* 19: 433. 1973.