Clave para las especies del género **Combretum** .

Por C.A. Stace.

1. Parte superior del hipanto más de 30 mm, largamente tubiforme; estilo fusionado al hipanto por más de 1/2 de su longitud. ..... **10. Combretum indicum**

1. Parte superior del hipanto menos de 30 mm, hipocraterimorfa infundibuliforme; estilo libre (**2**).

2(1). Pétalos y sépalos 4(-5); pétalos pelosos; fruto con 4(-5) alas o con 5 crestas; glándulas pediculadas presentes; escamas peltadas ausentes (**II.** subgen. **Cacoucia**) (**3**).

2. Pétalos y sépalos 4; pétalos glabros o diminutamente ciliados en el margen; fruto con 4 alas o 4 crestas; glándulas pediculadas ausentes; escamas peltadas presentes (algunas veces inconspicuas) (**I.** subgen. **Combretum**) (**6**).

3(2). Parte superior del hipanto y cáliz en conjunto más de 8 mm; fruto con 5 crestas marcadas (**4**).

3. Parte superior del hipanto superior y cáliz en conjunto menos de 5 mm; fruto maduro con 4 o 5 alas papiráceas a coriáceas (**5**).

4(3). Parte superior del hipanto y cáliz en conjunto 10-17 mm, 3.5-8 mm de ancho en la base de los sépalos en flores totalmente abiertas. ..... **6. Combretum graciliflorum**

4. Parte superior del hipanto y cáliz en conjunto 14-20 mm, 8-15 mm de ancho en la base de los sépalos en flores totalmente abiertas. **7.** ..... **Combretum cacoucia**

5(3). Partes superior e inferior del hipanto glabras a laxamente adpreso pelosas; flores 5-meras; fruto menos de 1.5 veces más largo que ancho. ..... **8. Combretum decandrum**

5. Partes superior e inferior del hipanto densamente adpreso pelosas; flores 4-meras; fruto más de dos veces más largo que ancho. ..... **9. Combretum rovirosae**

6(2). Flores menos de 5 mm; filamentos menos de 5 mm. ..... **5. Combretum laxum**

6. Flores más de 7 mm; filamentos más de 10 mm (**7**).

7(6). Hipanto densamente peloso, los tricomas ocultando la superficie del hipanto y las escamas. ..... **3. Combretum formosum**

7. Hipanto glabro a peloso, las escamas claramente visibles siempre (**8**).

8(7). Escamas de la inflorescencia rojas en material seco; parte superior del hipanto (punta del ovario hasta la punta de los sépalos) 9-13 mm; frutos más de 25 mm. ..... **4. Combretum assimile**

8. Escamas de la inflorescencia grises o amarillo-doradas en material seco; parte superior del hipanto (punta del ovario hasta la punta de los sépalos) 6-10 mm; frutos menos de 25 mm (**9**).

9(8). Hojas con el haz no pustulado o levemente pustulado; escamas de la inflorescencia amarillo doradas en material seco. ..... **1. Combretum fruticosum**

9. Hojas con el haz diminutamente pustulado; escamas de la inflorescencia grises en material seco. ..... **2. Combretum farinosum**