ANACARDIUM L.

Subarbustos a árboles muy grandes; plantas andromonoicas. Hojas alternas, agregadas hacia los extremos de las ramas, siempreverdes, simples, oblanceoladas a ampliamente obovadas, a veces ovadas, oblongas o elípticas, ápice redondeado, agudo a obtuso, acuminado, emarginado, retuso o truncado, base cuneada, obtusa, atenuada o auriculada, márgenes enteros, cartáceas a coriáceas, domacios frecuentemente presentes en las axilas de los nervios secundarios en el envés; sésiles o pecioladas. Inflorescencias terminales y/o axilares, tirsoides, brácteas frondosas, flores pediceladas, perianto imbricado, 5-mero; corola campanulada o formando un cilindro, las puntas reflexas; estambres (6) 810 (12), con 1 (2) ó 4 mucho más grandes, exertos en filamentos subulados o lineares, los estambres restantes más cortos y de longitud variable, con filamentos connados basalmente en un tubo estaminal de longitud variable, anteras presentes o ausentes, tecas diferenciadas o no y globosas; disco ausente; pistilo rudimentario en las flores estaminadas, ovario subgloboso a obovoide, 1-locular, con 1 óvulo basal, estilo terminal o lateral, estigma generalmente punctiforme, pedicelos acrescentes después de la fertilización y formando un hipocarpo obcónico, piriforme o sigmoideo en todas las especies excepto una (fuera de Nicaragua). Drupa reniforme o subreniforme, pericarpo leñoso con cavidades grandes rectangulares con aceites cáusticos; embrión curvado, cotiledones plano-convexos.

Un género neotropical con 11 especies, 1 de las cuales está cultivada en los trópicos; nativa desde Honduras hasta Paraguay y el sureste de Brasil; 2 especie se encuentran en Nicaragua.

J.D. Mitchell y S.A. Mori. The cashew and its relatives (*Anacardium*: Anacardiaceae). Mem. New York Bot. Gard. 42: 176. 1987.