TRIPLARIS Leofl. ex L.

Triplaris melaenodendron (Bertol.) Standl. & Steyerm., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23: 5. 1943; *Vellasquezia melaenodendron* Bertol.

Arboles, ramas mayormente huecas, con hormigas que muerden o pican viviendo en los tallos huecos o dentro de las ócreas; tallos café-rojizos, estrigosos a glabrescentes; plantas dioicas. Hojas ovado-elípticas a ovado-oblongas, 1535 cm de largo y 625 cm de ancho, ápice agudo o cortamente acuminado, base redondeada a obtusa, frecuentemente desigual, cartáceas, estrigosas en el envés; pecíolos 420 mm de largo; ócreas 1535 mm de largo, estrigosas, caducas o persistentes. Inflorescencias estaminadas semejantes a espigas, 18 desde las axilas, frecuentemente paniculiformes, las ramas 1025 cm de largo, flores fasciculadas, densamente amarillo-café estrigosas, 5 mm de largo, perianto de 3 tépalos lineares y 3 angostamente deltoides todos unidos abajo; inflorescencias pistiladas en racimos compactos, solitarias o apareadas, 520 cm de largo, brácteas amarillo-café estrigosas, flores solitarias, 1015 mm de largo, estilos 3. Perianto fructífero envolviendo estrechamente al aquenio, seco, persistente, largamente alado, alas oblanceoladas, 3050 mm de largo y 610 mm de ancho, partes internas del perianto mucho más pequeñas, adnadas al tubo cerca de la base; aquenio ovado, 11 mm de largo y 7 mm de ancho, fuertemente 3-angulado, caras ligeramente convexas, café-negro lustroso.

Común, bosques secos, zona pacífica; 0300 m; fl y fr feb, mar; *Sandino 4315*, *4959*; centro de México al norte de Sudamérica. Ramírez Goyena menciona *T. cumingiana* C.A. Mey., pero según Brandbyge esa es una especie distribuida desde Panamá hasta el norte de Colombia. Un género con 25 especies de Centro y Sudamérica, algunas ampliamente cultivadas por sus vistosos colores y por su fruto único en forma de banderilla.

J. Brandbyge. A revision of the genus *Triplaris* (Polygonaceae). Nordic J. Bot. 6: 545570. 1986.