166. Heteropogon Pers.

Por R.W. Pohl.

Anuales o perennes, cespitosas (Mesoamérica) o rizomatosas. Tallos sólidos, comprimidos. Vainas carinadas; lígula una membrana ciliada; láminas lineares, aplanadas o plegadas, carinadas en el envés. Inflorescencia un racimo solitario, cilíndrico, terminal o axilar; raquis sin desarticularse en la porción basal y con pares de espiguillas homomorfos, la porción superior desarticulándose entre pares de espiguillas dimorfas. Espiguillas homomorfas comprimidas dorsalmente, sin aristas, una pedicelada y una sésil, ocultando al raquis; gluma inferior herbácea, asimétrica, convexa, 7-9-nervia, gluma superior más ancha que la inferior, herbácea, más simétrica; flósculo inferior estéril; flósculo superior estéril o estaminado, con 3 estambres; lema inferior y superior iguales, hialinas; pálea inferior y superior ausentes. Espiguillas dimorfas con una espiguilla de cada par sésil y la otra brevipedicelada. Espiguillas sésiles cilíndricas, rígidas, pardas, hispídulas, largamente aristadas, con 2 flósculos; callo alargado, oblicuo, afilado, densamente híspido, formado por el entrenudo basal del raquis; gluma inferior coriácea, convexa, truncada, los márgenes incurvados y abrazando a la gluma superior en 2 canales formados entre una costilla media saliente y 2 bordes marginales; flósculo inferior estéril; lema inferior hialina, ciliada hacia el ápice, enervia; pálea inferior ausente; flósculo superior bisexual; lema superior reducida a la base hialina angosta de la arista, entera, la arista geniculada, torcida, pelosa, largamente exerta; pálea superior ausente; lodículas 2; estambres 3; estilos 2; fruto una cariopsis; hilo punteado. Espiguillas pediceladas más largas que las espiguillas sésiles, comprimidas dorsalmente, herbáceas, similares a las espiguillas homomorfas; pedicelos libres. 6 spp. Cosmopolita, probablemente nativa del Viejo Mundo.