BLAKEA P. Browne; *Topobea* Aubl.

Arboles, arbustos o trepadoras leñosas, frecuentemente epífitas, con ramitas teretes a cuadradas, glabras o variadamente pubescentes. Hojas coriáceas o cartáceas, 3–7-nervias o plinervias con los nervios secundarios transversales estrechamente espaciados, rectos y paralelos. Inflorescencia de flores axilares, solitarias o fasciculadas, típicamente pediceladas en las axilas de las hojas superiores, base del hipanto con 2 pares de brácteas decusadas, libres o parcialmente fusionadas, coriáceas o foliáceas, flores 6-meras; hipantos campanulados, hemisféricos o suburceolado; cáliz truncado o 6-lobado, persistente; pétalos glabros pero a menudo marginalmente ciliolados, blancos, rosados o rojos; estambres 12, isomorfos y glabros, anteras ovadas, oblongas, elípticas, linear-oblongas a lanceoladas o tubuladas, lateralmente comprimidas o hendidos pero frecuentemente confluentes en la antesis, libres o fusionadas, con 2 poros apicales típicamente bien separados o dorsalmente inclinados y aproximados, conectivo engrosado y sin apéndices o dilatadas basalmente en un espolón deflexo o cerca del punto de inserción del filamento; estigma punctiforme a capitado; ovario generalmente 6-locular, ínfero. Fruto una baya; semillas claviformes a angostamente piriformes, lisasor apenas foveoladas.

Género con unas 150 especies mejor representado en las regiones muy húmedo montanas desde México hasta Bolivia y Brasil, y en las Antillas; 5 especies se conocen en Nicaragua y una especie más se espera encontrar. El material de 2 colecciones incompletas recientes, *Moreno 23142* y *Stevens 9031* de Río San Juan y Zelaya, respectivamente, representa una seventh especie en nuestra área; son epífitas con hojas elípticas, 3-nervias, apicalmente acuminadas; las brácteas florales exteriores e internas son linear-oblongas y libres en la base; el cáliz es subtruncado y las anteras (en la yema joven) parecen ser apendiculadas y lateralmente cohesionadas en una porción de su longitud.

F. Almeda. New species and new combinations in *Blakea* and *Topobea* (Melastomataceae) with an historical perspective on generic limits in the tribe Blakeeae. Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 4, 46: 299–326. 1990; D.S. Penney and W. S. Judd. A revised circumscription for the Blakeeae (Melastomataceae) with associated nomenclatural adjustments. Phytokeys 20: 17—32. 2013.