79. Notopleura (Oerst.) Bremek.

Montamans Dwyer, *Psychotria* L. sect. *Notopleura* Oerst.

Por C.M. Taylor.

Hierbas osufrútices inermes, terrestres o epifíticos, ligeramente suculentos a muysuculentos, algunas veces monocaules (i.e., sin ramificarse), las floresbisexuales. Hojas opuestas, isofilas, enteras, sin domacios; nervadura nolineolada; estípulas unidas alrededor del tallo y/o a los pecíolos,persistentes o parcialmente caducas, la porción intrapeciolar reducida a biendesarrollada en una vaina truncada a triangular o 2-dentada, algunas veces conun apéndice suculento insertado en la base, centro o ápice, esto con frecuenciacaduco. Inflorescencias terminales y/o seudoaxilares, paniculadas,corimbiformes, cimosas, subcapitadas o capitadas, paucifloras a multifloras,sésiles a pedunculadas, bracteadas, generalmente verdes. Flores pediceladas asésiles, distilas o aparentemente no distilas, generalmente fragantes; limbocalicino (4)5-lobado, los lobos rara vez desiguales, sin calicofilos; corolainfundibuliforme a tubular, blanca o a veces teñida con rosado o amarillo,glabra o variadamente pelosa en el interior, los lobos (4)5-6, valvares,enteros, sin apéndices o algunas veces con una proyección abaxial; estambres(4)5, en las flores longistilas incluidos con las anteras situadas cerca oarriba del 1/2 del tubo corolino, en las flores brevistilas parcial acompletamente exertos; estigmas 2 o 4, lineares, en las flores longistilasexertos, en las flores brevistilas incluidos, situados cerca o arriba del 1/2del tubo corolino; ovario 2-6-locular, los óvulos 1 por lóculo, basales. Frutosen drupas, subglobosas a elipsoidales uobovoides, carnosas, blancas, amarillas, verdosas, rojas, anaranjadas o negras, a veces estipitadas; pirenos 2-6,1-loculares, hemisféricos (i.e., aplanado-convexos) en secciónтransversal o triangulares, duros, en la superficie abaxial (i.e., dorsal)lisos o longitudinalmente acostillados variadamente, en la superficie adaxial(i.e., ventral) lisos con 1 costilla o 1-3 surcos centrales longitudinales, losmárgenes algunas veces engrosados o agudos a ligeramente alados; semillaselipsoidales. 100 spp. México a Bolivia, Brasil, Antillas.

Taylor (2001) reconoció dos subgéneros: el subgen. *Notopleura* que contiene las especies terrestres coninflorescencias seudoaxilares; y el subgen. *Viscagoga* (Baill.) C.M. Taylor con las especiesepifíticas con inflorescencias terminales y/o seudoaxilares. Burger y Taylor (1993) trataron a las especies epifíticas (subgen. *Viscagoga*) de Costa Rica como sólo dos especies, pero con máscolecciones disponibles hoy día se pueden delimitar varias especies en CostaRica. Este grupo parece tener más especies en Costa Rica y Panamá que en laCordillera de los Andes. La biología floral (i.e., distila vs. monomórfica) noha sido bien estudiada y es muy difícil evaluar a partir de material deherbario. La posición aparente de las anteras y los estigmas se presenta en lasdescripciones, pero en la mayoría de los casos, sólo se ha visto un morfo delas flores distilas.

Bibliografía:Taylor, C.M. *Ann. Missouri Bot.Gard*. 88: 478-515 (2001); *Novon* 13: 228-260 (2003).