

57. **Bromus** L.

Por R.W. Pohl y G. Davidse.

Anuales o perennes, cespitosas o raramente rizomatosas. Tallos simples. Vainas con los márgenes unidos; lígula una membrana; láminas lineares, generalmente aplanadas. Inflorescencia una panícula terminal. Espiguillas comprimidas lateralmente, con 3-numerosos flósculos bisexuales; desarticulación arriba de las glumas y entre los flósculos; glumas 2, más cortas que el flósculo inferior, desiguales, herbáceas, 1-9-nervias; lemas herbáceas, 3-9-nervias, redondeadas o carinadas, el ápice agudo o 2-dentado, mútico o aristado entre los dientes; pálea 2-carinada, algo más corta que la lema; lodículas 2; ovario peloso, el ápice 2-lobado; estilos 2, subapicales. Fruto una cariopsis sulcada; hilo linear; embrión menor que 1/3 la longitud de la cariopsis. Aprox. 150-200 spp. Climas templados o montanos.

Bibliografía: Pinto-Escobar, P. *Bot. Jahrb. Syst.* 102: 445-457 (1981). Simon, B.K. *Austral. Syst. Bot. Soc. Newslett.* 33: 12-13 (1982). Soderstrom, T.R. y Beaman, J.H. *Publ. Mus. Michigan State Univ., Biol. Ser.* 35: 469-519 (1968). Wagnon, H.K. *Brittonia* 7: 415-480 (1952).