

46. *Agrostis* L.

Podagrostis (Griseb.) Scribner et Merr.

Por R.W. Pohl y G. Davidse.

Perennes o anuales, cespitosas, rizomatosas o estoloníferas. Lígula una membrana; láminas lineares, aplanadas a involutas. Inflorescencia una panícula terminal, abierta o cerrada. Espiguillas pequeñas, comprimidas lateralmente, con 1 flósculo bisexual; desarticulación arriba de las glumas; glumas más largas que el flósculo, iguales o subiguales, 1(-3)-nervias, agudas a acuminadas; lema membranácea, 3-5-nervia, con o sin una arista insertada dorsalmente, el ápice obtuso o eroso a 4-denticulado o cortamente 4-aristada; callo glabro a escasamente peloso; pálea ausente o presente, enervia o 2-nervia; raquilla generalmente no prolongada, raramente prolongada por detrás de la pálea como una cerda; lodículas 2 o ausentes; estambres 3; estilos 2; ovario glabro. Fruto una cariopsis sulcada; hilo punteado; endospermo sólido o pastoso. Aprox. 220 spp. Cosmopolita en regiones árticas y templadas o en altas montañas en los trópicos.

Este tratamiento es tentativo ya que *Agrostis* requiere, con urgencia, de una revisión a nivel mundial.