5. Chamguava Landrum
Por L.R. Landrum.

Arbustos o árboles hasta 20 m; tricomas hasta 0.3 mm, simples, blanquecinos, pardo rojizos o pardo amarillentos; ramitas tendiendo a ramificarse dicotómicamente. Hojas opuestas, persistentes, coriáceas a submembranáceas, la nervadura broquidódroma, la vena media impresa en el haz, marcada en el envés, las nervaduras laterales 14-30(-40) pares, inconspicuas, la nervadura marginal débil y casi paralela al margen. Inflorescencias unifloras o agregados de hasta 4 flores (probablemente brotes bracteados cortos) en las axilas foliares o en nudos sin hojas o en ramas más viejas, los pedúnculos con una flor. Flores 4-meras, sésiles o cortamente pedunculadas; bractéolas pequeñas, caducas cerca de la antesis; cáliz cerrado o con lobos separados, en su mayoría persistiendo hasta que el fruto madura; pétalos blanquecinos; estambres 75-160, doblados hacia el centro en el botón, blanquecinos, los filamentos siempre de pocas a varias veces más largos que las anteras en el botón, las anteras 0.5-0.8 mm, glandulares o no glandulares; ovario 2-locular, la placenta generalmente subpeltada (apenas un pedículo en forma de estípite en *C. musarum*), el pedículo de la placenta unido por encima del centro; óvulos (2-)4-80 por lóculo, multiseriados, saliendo de la placenta. Frutos en bayas globosas; semillas pocas, 6-10 mm, subreniformes; embrión amiláceo, sin aceite excepto por las glándulas superficiales, no liso cuando se corta en seco, en forma de media luna; cotiledones relativamente pequeños o no evidentes; hipocótilo grandemente engrosado, la médula central 1/5-1/8 del total del diámetro del hipocótilo. 3 spp. Guerrero a Panamá.
Bibliografía: Landrum, L.R. *Syst. Bot.* 16: 21-29 (1991).