198. STYRACACEAE

Descripción de la familia por P.W. Fritsch.

Árboles o arbustos. Indumento de escamas o tricomas estrellados. Hojas alternas, simples, pinnado-nervadas, sin estipulas. Inflorescencia en racimos o panículas pseudoterminales o laterales, algunas veces de apariencia corimbosa, rara vez de 1-2 flores, bracteolada. Flores actinomorfas, bisexuales, rara vez las plantas ginodioicas; hipanto adnato a la pared del ovario en varios niveles; cáliz campanulado, cupuliforme u obcónico, gamosépalo, los dientes o lobos (2-)4-6 o ausentes; corola generalmente blanca, gamopétala o rara vez los pétalos libres, 4-5(-8)-lobada, los lobos casi siempre más largos que el tubo, valvados o imbricados en el botón; estambres el doble (rara vez hasta 4 veces) o el mismo número que el de los lobos de la corola, adnatos a la corola o rara vez casi libres; filamentos generalmente aplanados, parcial o casi completamente connatos o rara vez libres; anteras introrsas, 2-loculares, basifijas, longitudinalmente dehiscentes, oblongas a lineares; ovario parcial o completamente ínfero, incompletamente 2-5-locular o apicalmente 1-locular por falla en la unión de los septos; estilo 1, simple, filiforme o tubulado, hueco; estigma terminal, truncado o diminutamente lobado; placentación esencialmente axilar (rara vez basal); óvulos 1-c. 30 en cada lóculo, anátropos. Fruto en drupa seca o carnosa o en cápsula; hipanto y cáliz persistentes. Semillas 1-3(-50), globosas a fusiformes, rara vez aladas; endospermo abundante; embrión recto, rara vez curvado; cotiledones aplanados o casi teretes. 11 gen.Estados Unidos a Argentina, E. del Mediterráneo, E. y SE. de Asia.

Bibliografía: Perkins, J. *Pflanzenreich* IV. 241(Heft 30): 1-111 (1907).

El único género en Mesoamérica es *Styrax* .