Clave para los géneros de la familia **Dryopteridaceae**.

Por R.C. Moran.

1. Hojas estériles y fértiles marcadamente dimorfas (2).

1. Hojas estériles y fértiles monomorfas o, raramente, algo dimorfas (4).

2(1). Soros indusiados. ... 5. Maxonia

2. Soros no indusiados (3).

3(2). Lámina con una pinna apical similar en forma a las pinnas laterales; meristelas dispuestas irregularmente, no rodeadas por una vaina esclerenquimatosa oscura. ... 6. Olfersia

3. Lámina con ápice pinnatífido o de similar forma que las pinnas laterales; meristelas dispuestas circularmente, cada una rodeada por una vaina esclerenquimatosa oscura. ... 8. Polybotrya

4(1). Soros alargados; pínnulas dimidiadas. ... 3. Didymochlaena

4. Soros redondos; pínnulas no dimidiadas (5).

5(4). Soros no indusiados (6).

5. Soros indusiados (7).

6(5). Ápice de las nervaduras del mismo ancho que la nervadura, terminando en el margen o muy cerca de éste; láminas sin glándulas internas punteadas; pinnas o pínnulas aristadas. ... 9. Polystichum

6. Ápice de las nervaduras claviformes, terminando antes del margen; láminas con glándulas internas punteadas; pinnas o pínnulas no aristadas. ... 10. Stigmatopteris

7(5). Láminas 1-pinnadas, el ápice una pinna terminal similar en forma a las pinnas laterales. ... 7. Phanerophlebia

7. Láminas 1-pinnado-pinnatífidas a 4-pinnadas, el ápice pinnatífido (8).

8(7). Indusio peltado. ... 9. Polystichum

8. Indusio insertado junto a un seno angosto (9).

9(8). Segmentos aristados. ... 1. Arachniodes

9. Segmentos acuminados, agudos o redondeados (10).

10(9). Rizomas erectos o decumbentes. ... 4. Dryopteris

10. Rizomas horizontales, rastreros (11).

11(10). Láminas deltadas; pinnas basales inequiláteras, prolongadas basiscópicamente. ... 1. Arachniodes

11. Láminas lanceoladas, 1-2-pinnado-pinnatífidas; pinnas basales equiláteras o casi equiláteras. ... 2. Cyclodium