Conocarpus erectus L., Sp. Pl. 176. 1753.

Arbustos o árboles, hasta ca 10 m de alto, sin neumatóforos pero a veces con raíces zancudas; plantas tal vez funcionalmente dioicas pero con variación en el grado de desarrollo morfológico de los órganos femeninos y masculinos. Hojas alternas, angostamente elípticas o a veces elípticas, 312 cm de largo y 13.5 cm de ancho incluyendo el pecíolo, ápice y base gradualmente ahusados, con 2 glándulas sésiles en el pecíolo o en la lámina decurrente, glabras o a veces densamente argénteo-seríceas, con conspicuas fóveas (domacios) en las axilas de la mayoría de los nervios laterales del envés. Inflorescencia un racimo axilar o terminal o una panícula de capítulos más o menos globosos de 35 mm de diámetro; flores amarillo-verdoso pálidas a blanquecinas, con cierta fragancia; hipanto inferior densamente aplicado-pubescente, hipanto superior cupuliforme, escasamente pubescente, con 5 sépalos; pétalos ausentes; estambres (5) 10, exertos hasta 2 mm en las flores masculinas, de otro modo variadamente más cortos o abortados. Frutos secos, densamente amontonados en capítulos globosos a elipsoides, 515 mm de largo y 713 mm de ancho, aplanados y más o menos 2-alados, encorvados, coronados por el hipanto superior por lo menos hasta cuando maduros.

Frecuente en manglares pantanosos y terrenos arenosos cerca del mar, a lo largo de las costas pacífica y atlántica; 030 m; fl y fr durante la mayor parte del año; *Stevens 3717*, *Vincelli 666*; ampliamente distribuida desde México al norte de Perú y centro de Brasil, las Antillas y Africa occidental. La mayoría de las plantas nicaragüenses pertenecen a *C. erectus* var. *erectus*, pero unas pocas plantas con hojas argénteo-seríceas pertenecen a *C. erectus* var. *sericeus* DC., que es una variante rara y esporádica a lo largo de la extensión de la especie en América. El género contiene 1 especie más del noreste de Africa y Arabia. "Botoncillo", "Buttonwood".