

Por Robert Kral

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral, Sida 4: 72. 1971; *Carex ovata* Burm. f.; *A. monostachya* (L.) Vahl. Perennes, cespitosas, 3070 cm de alto, lisas, base bulbosa; plantas hermafroditas. Hojas basales, láminas linear-filiformes, ca 1/2 de la longitud de la planta y 1 mm de ancho, aplanadas o involutas con márgenes engrosados, lisas; vaina abierta, sin lígula. Escapos subteretes, delgados, ca 1 mm de grueso, multiacostillados, terminando en una espiga solitaria o 2 ó 3 dispuestas en arreglos lineares o cimosos; espiguillas lanceolado-ovoides, ca 11.5 cm de largo, agudas, con numerosas escamas subdísticas, la bráctea inferior con ápice largo pero sin exceder a la espiga, por lo menos las flores más inferiores perfectas; escamas fértiles ovadas, naviculares, agudas y mucronadas, lisas, verde-amarillo pálidas o pajizas; estambres 13; estilo trífido, triquetro en la base, liso. Fruto con cuerpo globoso, estipitado-obovoide, ca 2.53 mm de largo, gruesamente tuberculado, blanco.

Rara, sabanas, zona atlántica; ca 150 m; fl y fr jun; *Davidse 30794*, *Oersted 14494*; Estados Unidos (Florida) a Sudamérica y en las Antillas, también en los trópicos del Viejo Mundo. Un género de tamaño discutible con un mínimo de ca 15 especies, en los trópicos y subtropicos de ambos hemisferios.